

TABEL 3			NIEUW-ZEELAND 2006		
Aantal waargenomen soorten	AMFIBIEËN & REPTIELEN		HANDVANGST (HV)	VISUEEL (VO)	VERKEERSSLACHTOFFER (VS)
	WIJZE VAN OBSERVATIE (in functie van eerste observatie)				
1	<i>Cyclodina aenea</i>	<i>Copper skink</i>	2	2	0
2	<i>Cyclodina ornata</i>	<i>Ornate skink</i>	1	2	0
3	<i>Oligosoma moco</i>	<i>Moko skink</i>	2	0	0
4	<i>Lampropholis delicata</i>	<i>Rainbow skink</i>	3	1	0
5	<i>Sphenodon punctatus</i>	<i>Tuatara</i>	3	1	0
6	<i>Oligosoma nigriplantare</i>	<i>Common skink</i>	6	26	0
7	<i>Litoria ewingii</i>	<i>Whistling frog</i>	3	4	0
8	<i>Oligosoma maccanni</i>	<i>McCann's skink</i>	1	1	0
9	<i>Naultinus gemmeus</i>	<i>Jewelled gecko</i>	3	3	0
10	<i>Hoplodactylus maculatus</i>	<i>Common gecko</i>	2	1	0
subtotaal			26	41	0
EINDTOTAAL			67		